

7歳までの予防接種 スケジュールシート

大切な子どもをVPD(ワクチンで防げる病気)から守るためには、接種できる時期になったらできるだけベストのタイミングで、忘れずに予防接種を受けることが重要です。このスケジュールはNPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会によるもっとも早期に免疫をつけるための提案です。お子さまの予防接種に関しては、地域ごとの接種方法や VPD の流行状況に応じて、かかりつけ医と相談のうえスケジュールを立てましょう。

ワクチン名	接種済み <input checked="" type="checkbox"/>	0 歳											1 歳											2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳					
		1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳 1か月	1歳 2か月	1歳 3か月	1歳 4か月	1歳 5か月	1歳 6か月	1歳 7か月	1歳 8か月	1歳 9か月	1歳 10か月	1歳 11か月	(満年齢)										
不活化ワクチン B型肝炎	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	← ① ② →											← ③ →																		
生ワクチン ロタウイルス	任意	<input type="checkbox"/>	1価 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5価 <input type="checkbox"/>	← 1 2 →											← ③ →																	
不活化ワクチン ヒブ	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①	②	③	← ④ →																									
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①	②	③	← ④ →																									
不活化ワクチン 四種混合 (DPT-IPV) 2012年11月導入	定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①	②	③	← ④ →																									
生ワクチン BCG	定期	<input type="checkbox"/>	← ① →																															
不活化ワクチン 三種混合 (DPT) ポリオ(単独) 2012年9月導入	定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	三種混合 (DPT) とポリオの接種が完了していない場合のスケジュールは、かかりつけ医にご相談ください。																												
生ワクチン MR (麻しん風しん混合)	定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	← ① →											MR (麻しん風しん混合) : 小学校入学の前年 (幼稚園・保育園の年長に相当) 1年間に接種 (4月~6月がおすすめ)											← ② →								
生ワクチン おたふくかぜ	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	← ① →											← ② →																			
生ワクチン みずぼうそう (水痘)	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	← ① →											← ② →																			
不活化ワクチン 日本脳炎	定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	追加接種は、初回接種から約3か月の間隔をあけて受けましょう。											← ① ② ③ →																		
不活化ワクチン インフルエンザ	任意	毎秋	インフルエンザ : 毎年、10月から11月ごろに接種しましょう。											← ① ② ③ →																				

ロタウイルスワクチンには、1価ワクチンと5価ワクチンがあります。できるだけ生後14週6日までに接種を開始し、それぞれの必要接種回数を受けましょう。

ロタウイルス・ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合の必要接種回数を早期に完了するには、同時接種で受けることが重要です。

接種費用の助成制度があります。お住まいの自治体に確認してください。

個別接種の場合はヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合などと同時接種で受けられます。

二種混合 (DT) : 11歳で追加接種 (接種対象11-12歳)

不活化ワクチン 定期 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。 定期予防接種の対象年齢 **←○→** おすすめの接種時期(数字は接種回数)

生ワクチン 任意 多くは有料(自己負担)。ワクチンによっては公費助成があります。任意接種ワクチンの必要性は定期接種ワクチンと変わりません。 任意接種の接種できる年齢 ●次にほかの種類のワクチンが接種できるのは、不活化ワクチン接種後は1週間後の同じ曜日から、生ワクチン接種後は4週間後の同じ曜日からです。

同時接種：同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。 国や日本小児科学会は乳幼児の接種部位として大腿外側部も推奨しています。くわしくはかかりつけ医にご相談ください。 詳しい情報は <http://www.know-vpd.jp/> **VPD** **検索**